

Puntos Claves

¿Son los pre cánceres y cánceres ginecológicos en niñas y adolescentes muy poco comunes? ¿Cuales son las diversas afecciones que se ven?

CANCER VULVAR - Muy poco frecuente. El pre cáncer se ve mas frecuentemente que el cáncer. Sin embargo esta enfermedad también es rara. Puede estar asociada con estados inmunodeprimidos.



CANCER VAGINAL – Aunque es poco común, ocurre.

- Rabdomiosarcoma (RMS) es el sarcoma de tejido blando mas común que se observa en niñas.
- El sarcoma botrioide es el RMS mas común.

CANCER CERVICAL – Esta afección muy rara vez se ve en niñas y adolescentes.

- Iniciar el Papanicolaou a los 21 años.
- Iniciar la prueba de PVH a los 30 años.

CANCER UTERINO/ DE ENDOMETRIO –

Esta afección es muy poco frecuente.

- Enfermedad trofoblástica gestacional.
- Adenocarcinoma de endometrio (potencialmente asociado con síndrome de ovario poliquístico)



**The Childhood Gynecologic
Cancer Association (CGYNCA)**
Post Office Box 3130
Ann Arbor, Michigan 48106-3130

Phone: 734-395-2596

E-mail: hope@cgynca.org

© 2016

**ASOCIACIÓN DEL CÁNCER
GINECOLÓGICO EN LA INFANCIA**

www.cgynca.org

Enfermedades de la vulva, la vagina, el cuello uterino y el útero



Información para Profesionales de la Salud



Tel: 734 395-2596

La Asociación de Cáncer Ginecológico en la Infancia es una organización registrada 501 (c)3 sin fines de lucro interesada en ayudar pacientes y familias afectadas por el cáncer vulvar, vaginal, cervical, uterino o de ovario.

La educación es de suma importancia para pacientes y familias así como también para profesionales de atención médica.

Directora Ejecutiva

Hope Haefner, MD

Miembros del Directorio

Lindsay Frazier, MD, ScM

David Gershenson, MD

Barbara Getty, NP

Carolyn Johnston, MD

Leslie Schover, PhD



PRECANCER Y CANCER VULVAR

Las enfermedades malignas vulvares en la población adolescente y pediátrica son muy poco frecuentes. El precáncer vulvar relacionado con el papiloma virus humano (PVH) se está diagnosticando con mucha más frecuencia en la población adolescente.

Condiciones Precancerosas de la Vulva

TERMINOLOGIA (2012)

Lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado (LSIL)

Lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado (HSIL)

VIN, tipo diferenciado

. En la actualidad, aproximadamente el 80% de las pacientes con HSIL son PVH positivas. Las pacientes pueden ser asintomáticas o quejarse de picazón o ardor.

Tratamiento: Cirugía (VIN diferenciado, HSIL) Laser (HSIL) (es importante alentar el abandono del tabaquismo).

Es importante conversar con las pacientes sobre la vacuna PVH. Sigue siendo importante conversar de la vacuna PVH con adolescentes con condiloma y/o LSIL o HSIL. Es muy improbable que las pacientes estén expuestas a todos los tipos de PVH que están en las vacunas.

Cánceres vulvares: melanomas, leiomiomas, linfomas y tumores neuroendocrinos.

CANCER VAGINAL – Rbdomiosarcoma (RMS) es el sarcoma de tejido blando más común que se observa en niñas. El sarcoma botrioides es el RMS más común. Otros tumores incluyen tumores del saco vitelino y el adenocarcinoma vaginal.

CANCER CERVICAL – Esta afección muy rara vez se ve en niñas y adolescentes. No se recomienda el screening con citología hasta los 21 años. La prueba de PVH no se recomienda hasta los 30 años. Se recomienda y aprueba la vacunación contra el PVH en niñas y niños.

CANCER UTERINO/ DE ENDOMETRIO – La enfermedad trofoblástica gestacional (ETG) es muy poco frecuente en niñas, pero puede ocurrir en adolescentes. Las adolescentes se encuentran en un alto riesgo de sufrir esta enfermedad. ETG consiste en embarazos molares parciales o completos, tumores trofoblásticos placentarios y coriocarcinomas. El adenocarcinoma de endometrio en adolescentes es extremadamente raro.

**The Childhood Gynecologic
Cancer Association (CGYNCA)
Post Office Box 3130**

Phone: 734-395-2596

E-mail: hope@cgynca.org